

Instituut voor Tropische Geneeskunde  
Nationalestraat 155  
2000 Antwerpen

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid  
Rue J. Wytsman 14  
1050 Brussel



Wetenschappelijke Studiegroep Reisgeneeskunde  
Groupe d'Etude Scientifique de la Médecine des Voyages

**EDITIE 2009-2010**

**CONSENSUSVERGADERING 19/06/2009**

- Basistekst : “Medische informatie voor reizigers”
- Tabel : “Gelekoortsvaccinatie per land”
- Tabel : “Vaccinaties en malaria-advies per land”
- Printout : “Malaria-advies per land” (bron : <http://www.itg.be>)
- Centra voor vaccinatie tegen gele koorts
- Kaart malaria-zones A,B,C : <http://www.itg.be/ITG/GeneralSite/MedServ/pg/Nmalaria.htm>

**Versie : 22/07/2009**

Onder de auspiciën van **DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD – SECTIE VACCINATIES**

**Verantw. red. Pr. A. Van Gompel, ITG**

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Abu Dhabi = Ver.Ar. Em.		(a)	p	(b)	(t)					
Afghanistan	d	a	p	b	t				(C)	Mei - november
Albanië	d	a		b	(t)					
Algerije	d	a	p	(b)	t				((A))	
Andorra				*						
Angola	c	a	p	b	t	(m)			C	
Anguilla/Antigua/Barbuda (Car.)	d	(a)		(b)	(t)					
Argentinië	**	a		*	(t)				(A)	** GK "WHO : recommended for northern regions & Foz d'Iguaçu"
Armenië (ex-USSR)		a		*	(t)				((A))	Juni - oktober
Australië	d			*			(j) (7-12)			Jap. Enc. : Queensland
Azerbeidzjan (ex-USSR)		a		b	t				(A)	Juni - oktober
Azoren = Portugal										

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis (e)** = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Bahamas (Atl.Oc.)	d			*					(A)	Zeer sporadisch transmissie van falciparum malaria op Great Exhuma eiland. Bij koorts na terugkeer aan malaria denken.
Bahrein	d	(a)	p	(b)	(t)					
Bangladesh	d	a	p	b	t		(j) (7-12)		(C)	
Barbados (Car.)	d	(a)		(b)	(t)					
Belize	d	a		(b)	(t)				A	
Benin	c	a	p	b	t	m			C	
Bermuda eilanden (Atl. Oc.)				*						
Boetan	d	a	p	b	t		(j)		(C)	
Bolivia	c° **	a		(b)	t				(A)/C	C : Amazonië ** GK “WHO : recommended for certain areas” Ambassades eisen dikwijls een bewijs van vaccinatie
Bosnië-Herzegovina (ex-Jougosl.)		a		(b)	(t)			(e) ?		

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van **risicogedrag**, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Botswana	d	a	p	b	t				(C)	November - mei
Brazilië	c° **	a		b	(t)				C	C : Amazonië ** GK "WHO : recommended for many areas & Foz D'Iguaçu"
Brunei-Darussalam	d	(a)	p	(b)	(t)		(j)			
Bulgarije		a		(b)	(t)			(e) ?		
Burkina Faso	c	a	p	b	t	m			C	
Burundi	c	a	p	b	t	(m)			C	
Cambodja	d	a	p	b	t		j (5-10)		C	
Canada				*						
Cayman eil. (Car.)				*						
Centraal Afr. Rep.	c	a	p	b	t	(m)			C	
Chili + Paaseilanden		a		*	(t)					
China	d	a	p	b	(t)		(j) (5-10)		((A/C))	

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

WHO Kaart: [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; Gedetailleerde WHO-richtlijnen: <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

WHO-kaart [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Christmas eiland (Ind. Oc.)	d	a	p	(b)	(t)					
Colombia	c° **	a		(b)	t				(C)	**GK "WHO : recommended for many zones"
Comoren (Ind. Oc.)		a	p	b	t				C	
Cook eilanden (Pac.)		a		(b)	(t)					
Costa Rica	d	a		(b)	(t)				(A)	
Cuba		a		(b)	(t)					
Cyprus		(a)		(b)						
Djibouti	d	a	p	b	t	(m)			C	
Dominica (Car.)	d	a		(b)	(t)					
Dominicaanse rep		a		(b)	(t)				(A)	
Duitsland				*				(e)		
Ecuador (& Galapagos)	c° **	a		(b)	t				(C)	**GK "WHO : recommended for certain areas"
Egypte	d	a	p	(b)	t					

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
El Salvador	d	a		(b)	t				(A)	
Emiraten (ver. Arab.)		(a)	p	(b)	(t)					
Eritrea	d	a	p	b	t	(m)			C	
Estland (Baltische Rep.)		(a)		*				(e)		
Ethiopië	c° **	a	p	b	t	m			C	**GK "WHO : recommended"
Falkland-eilanden		a		(b)	(t)					
Fiji eilanden	d	a		(b)	(t)					
Filipijnen	d	a	p	b	(t)		(j)		(C)	Zie tekst
Finland				*						
Gabon	c	a	p	b	t				C	
Gambia	c° **	a	p	b	t	m			C	*GK "WHO : recommended"
Georgië (ex-USSR)		a		(b)	(t)				((A))	Juni tot oktober
Ghana	c	a	p	b	t	(m)			C	

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

WHO Kaart: [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; Gedetailleerde WHO-richtlijnen: <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

WHO-kaart [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Grenada (Car.)	d	a		(b)	(t)					
Griekenland		(a)		*						
Groenland		(a)		b						
Guadeloupe (Car.)	d	a		(b)	(t)					
Guam (Pac.)		a		(b)	(t)					
Guatemala	d	a		(b)	(t)				(A)	
Guinea (Conakry)	c° **	a	p	b	t	m			C	**GK "WHO : recommended"
Guinea Equatoriale	c° **	a	p	b	t				C	**GK "WHO : recommended"
Guinea Bissau	c° **	a	p	b	t	m			C	**GK "WHO : recommended"
Guyana (British Guyana)	c° **	a		(b)	(t)				C	**GK "WHO : recommended"
Guyane Française	c	a		(b)	(t)				(C)	
Haïti	d	a		(b)	t				(A)	
Honduras	d	a		(b)	(t)				(A)	

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis (e)** = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Hongarije		(a)		*				(e)		
Hongkong (China, SAR)		(a)	p	(b)						
India	d	a	p	(b)	t		(j)		(B/C)	Zie tekst
Indonesië	d	a	p	b	t		(j)		(C)	Zie tekst
Irak	d	a	p	(b)	t				(A)	
Iran	d	a	p	(b)	t				(A/C)	
Israël		(a)		(b)	(t)					
Italië		(a)		*						
Ivoorkust	c	a	p	b	t	(m)			C	
Jamaica (Car.)	d	a		(b)	(t)					
Japan				*						
Jemen	d	a	p	(b)	t				C	

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japanse encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Jordanië	d	a		(b)	(t)					
Kaapverdise eil. (Atl.Oc.)	d	a	p	b	t				((A))	
Kameroen	c	a	p	b	t	(m)			C	
Kanarische eilanden = Spanje										
Kazachstan (ex-URSS)	d	a		b	t					
Kenya	c° **	a	p	b	t	(m)			C	**GK "WHO : recommended"
Kirgizstan (ex-URSS)		a		b	t				((A))	
Kiribati	d	a		(b)	(t)					
Koeweit		(a)	p	(b)	(t)					
Kongo (Brazzaville)	c	a	p	b	t	(m)			C	
Kongo (Democr. rep.)	c	a	p	b	t	(m)			C	
Korea (N)	d	a	p	b	t		(j) (8-10)		((A))	
Korea (Z)		(a)	p	b			(j) (8-10)		((A))	

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith)) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis (e)** = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Kroatië (ex-Yougoslavië)		(a)		*	(t)			(e)		
Laos	d	a	p	b	t		j (5-10)		C	behalve Vientiane
Letland (Baltische rep. )		(a)		*				(e)		
Lesotho	d	a	p	b	t					
Libanon	d	a	p	(b)	(t)					
Liberia	c	a	p	b	t	(m)			C	
Libië	d	a	p	(b)	t					
Litouwen (Baltische rep. )		(a)		(b)				(e)		
Maagdeneilanden (Brits/US /Car)		a		(b)	(t)					
Macau (China, SAR)		(a)	p	(b)						
Macedonie (ex-Yougoslavië)		(a)		(b)						
Madagascar	d	a	p	b	t				C	

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

WHO Kaart: [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; Gedetailleerde WHO-richtlijnen: <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

WHO-kaart [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Madeira en Azoren (Atl.Oc/Port)	d	(a)		(b)						
Malawi	d	a	p	b	t				C	
Maldiven	d	a	p	(b)	(t)					
Maleisië	d	a	p	b	(t)		(j)		(C)	
Mali	c	a	p	b	t	m			C	
Malta	d	(a)		*						
Marianen eil. ( Northern / Pac.)		a		(b)	(t)					
Marokko		a	p	(b)	(t)				((A))	
Marshall eil. (Pac.)		a		(b)	(t)					
Martinique (Car.)		(a)		(b)	(t)					
Mauritanië	c/c°	a	p	b	t	(m)			(C)	Zie tekst / ** GK : c = zo in het zuiden of zo langer dan 2 weken verblijf

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)

d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
	**									
Mauritius	d	(a)	p	(b)	(t)					
Mayotte (Fr. Comoren) (Ind.Oc.)		a	p	b	t				C	
Mexico		a		(b)	(t)				(A)	
Micronesië (Fed. Staat)		a		(b)	(t)					
Moldavië (ex-USSR)		a		b	(t)			(e)		
Mongolië		a	p	b	t	(m)				
Montserrat (Car.)	d	(a)		(b)	(t)					
Mozambique	d	a	p	b	t	(m)			C	
Myanmar (Birma)	d	a	p	b	t				(C)	Zie tekst
Namibia	d	a	p	b	t				(C)	november – mei Zie tekst
Nauru (Pac.)	d	a		(b)	(t)					

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)

d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Nederlandse Antillen (Car.)	d	(a)		(b)						
Nepal	d	a	p	(b)	t		((j))		(B)	
Nicaragua	d	a		(b)	t				(A)	
Nieuw-Caledonië (Pac.)	d	a		(b)	(t)					
Nieuw-Zeeland (Pac.)				*						
Niger	c	a	p	b	t	m			C	
Nigeria	c° **	a	p	b	t	m			C	**GK "WHO : recommended"
Niue (Pac.)	d	a		(b)	(t)					
Oeganda	c° **	a	p	b	t	(m)			C	**GK "WHO : recommended"
Oekraïne		a		*	(t)			(e)		
Oezbekistan (ex USSR)		a		b	t				((A))	
Oostenrijk				*				(e)		
Oost-Timor : zie Timor Leste										

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith)) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Oman	d	(a)	p	(b)	(t)					
Pakistan	d	a	p	(b)	t		(j) (6-1)		(C)	ook in Karachi
Palau (Pac.)	d	a		(b)	(t)					
Panama	c° **	a		(b)	(t)				(A)/(C)	**GK "WHO : recommended for certain areas"
Papoea Nieuw-Guinea	d	a	p	b	t		(j)		C	
Paraguay	c°	a		(b)	(t)				(A)	
Peru	c° **	a		b	t				(A)/C	**GK "WHO : recommended for certain areas"
Pitcairn (Pac.)	d	a		(b)	(t)					
Polen		(a)		*				(e)		
Polynesië (Frans) (Pac.)	d	a		(b)	(t)					
Portugal	d *	(a)		*						**GK : d = alleen voor de reizigers van en naar de Azoren en Madeira
Puerto Rico (Car.)		a		(b)	(t)					

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Qatar		(a)	p	(b)	(t)					
Reunion eiland (Ind. Oc.)	d	(a)	p	(b)	(t)					
Roemenië		a		(b)	(t)			(e) ?		
Russische feD. (ex-USSR)		a		(b)	(t)			(e)		
Rwanda	c	a	p	b	t	(m)			C	
Salomon eilanden (Pac.)	d	a		b	t				C	
Samoa (Amerikaans / Pac.)	d	a		b	(t)					
Sao Tome & Principe (Atl. Oc.)	c	a	p	b	t				C	
Saoedi-Arabië	d	a	p	(b)	(t)	m***			(C)	*** bedevaarders Hadj/Umra
Senegal	c° **	a	p	b	t	m			C	**GK "WHO : recommended"
Servië & Montenegro (incl. Kosovo) (ex- Joegoslavië)		a		(b)	(t)			(e)		

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Seychellen (Ind. Oc.)	d	(a)	p	b	(t)					
Sierra Leone	c	a	p	b	t	(m)			C	
Singapore	d	(a)		(b)						
St-Hélène (Atl. Oc.)	d	(a)	p	(b)	(t)					
St-Lucia (Car.)	d	(a)		(b)	(t)					
St-Kitts & Nevis (Car.)	d	(a)		(b)	(t)					
St Pierre & Miquelon (Fr.)				*						
St-Vincent & Grenadines (Car.)	d	(a)		(b)	(t)					
Slowakije		(a)		*				(e)		
Slovenië (ex-Joegoslavië)		(a)		*	(t)			(e)		
Soedan	c° **	a	p	b	t	m			C	**GK "WHO : recommended" & certificate may be required on leaving the country
Somalië	c° **	a	p	b	t	(m)			C	**GK "WHO : recommended "

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)

d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van **risicogedrag**, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Spanje		(a)		*						
Sri Lanka	d	a	p	(b)	t				(B)	
Stille Oceaan eil. (USA) (Pac.)		a		(b)	(t)					
Suriname	c° **	a		(b)	t				C	**GK "WHO : recommended"
Swaziland	d	a	p	b	t				C	
Syrië	d	a		(b)	(t)				((A))	
Tadzjikistan (ex USSR)		a		b	t				(B)	Juni tot oktober
Taiwan		a	p	b	(t)		(j) (4-10)			
Tanzania (& Zanzibar)	c° **	a	p	b	t	(m)			C	**GK "WHO : recommended" Ambassades eisen dikwijls een bewijs van vaccinatie
Thailand	d	a	p	b	(t)		(j) (5-10)		((C))	
Timor-Leste (Oost-Timor)	d	a	p	b	t		(j)		C	

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van **risicogedrag**, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Togo	c	a	p	b	t	(m)			C	
Tonga (Pac.)	d	a		b	(t)					
Trinidad en Tobago (Car.)	d **	(a)		b	(t)					**GK "WHO : recommended" for Trinidad, niet voor Tobago
Tsjaad	c	a	p	b	t	m			C	
Tsjechië		(a)		*				(e)		
Tunesië	d	a	p	(b)	(t)					
Turkije		a	p	(b)	(t)				(A)	
Turkmenistan (ex USSR)		a		b	t				((A))	Juni tot oktober
Tuvalu		a	p	(b)	(t)					
Uruguay	d	a		*	(t)					
Vanuatu		a		(b)	(t)				C	
Venezuela	c° **	a		(b)	(t)				(A/C)	C : ten zuiden van de Orinoco (Amazonië) // **GK "WHO : recommended"
Verenigde Arabische Emiraten		(a)	p	(b)	(t)					

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)  
d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.

LAND	G.K.	H. A	Polio	H.B *	BKTYFUS	MNG.	JAP.E.	FSME	MAL.	OPMERKINGEN (over malaria, tenzij anders aangegeven, bvb GK)
Vietnam	d	a	p	b	t		J (5-10)		(C)	
Wake eiland (Pac.)		a		(b)	(t)					
Wit-Rusland (ex-USSR)		a		(b)	(t)			(e)		
Zambia		a	p	b	t	(m)			C	
Zimbabwe	d	a	p	b	t				C	Beneden de 1200 m
Zuid-Afrika	d	(a)	p	(b)	(t)				(C)	In een zeer beperkte regio in het Noord-Westen

**Gele Koorts** c = vaccinatie verplicht; c° = vaccinatie strikt aanbevolen tot noodzakelijk (het land eist het niet per se, maar gele koorts komt voor of kan voorkomen in dit land)

d = in het land van bestemming zelf is geen gele koorts; vaccinatie is alleen maar verplicht als men vanuit een land afreist met risico voor gelekoortstransmissie.

**WHO Kaart:** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps; **Gedetailleerde WHO-richtlijnen:** <http://www.who.int/ith/ITH2009Countrylist.pdf>

**Hepatitis A** a = hoog risico, vaccinatie sterk aanbevolen tot noodzakelijk, wat ook de duur en de omstandigheden van de reis zijn

(a) = matig tot laag risico, de indicatie voor vaccinatie hangt af van de reisduur, accommodatie, frequentie van reizen. NB na volledige vaccinatie = levenslang immuun

**Polio** p = het virus circuleert nog in het land of in landen in de buurt (p) = het virus circuleert niet meer in dit land, maar is nog aanwezig op dit continent.

**WHO-kaart** [www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps – een eenmalige rappel bij een volwassene geeft levenslange immuniteit

**Hepatitis B :** (\*) = de vaccinatie-indicatie hangt in de eerste plaats af van risicogedrag, ook – zij het in mindere mate - van reisbestemming, reisduur en reisfrequentie

b = land met hoge prevalentie dragers van het hepatitis B virus; (b) = land met intermediaire prevalentie dragers. Levenslange immuniteit na geslaagde vaccinatie.

**Buiktyfus :** de vaccinatie-indicatie hangt af van reisduur, accommodatie, frequentie van reizen; t = land met relatief hoog risico; (t) = land met matig tot laag risico

**Meningokokkenmeningitis :** vaccinatie-indicatie indien in nauw contact met de bevolking of voor een langere reis (minstens 4 weken)

m = land in de Afr. meningitisgordel ([www.who.int/ith](http://www.who.int/ith) → disease distribution maps & <http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Menin.aspx>: epidemieën mogelijk van eind dec – eind juni); (m) = in uitzonderlijke omstandigheden kan er een epidemie zijn, te volgen via [www.promedmail.org](http://www.promedmail.org) zie ook <http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no10/03-0182-G2.htm>

**Japane encefalitis** voor langer verblijf (minstens 4 weken), ruraal, (tussen haakjes: de maanden tijdens dewelke er risico is) <http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm> → table

j = land met redelijk risico; (j) = slechts in welbepaalde tot uitzonderlijke omstandigheden (epidemie) is er risico

**Tekenencefalitis** (e) = enkel in geval van risico-activiteiten in de omschreven gebieden [www.zecken.de/index.php?id=502](http://www.zecken.de/index.php?id=502)

**MALARIA :** A/B/C = malaria-chemoprophylaxe aanbevolen. Voor de details, raadpleeg de tekst of raadpleeg de website : <http://www.itg.be>

(A)/(B)/(C) = malaria-chemoprophylaxe alleen aanbevolen in bep. omstandigheden binnen het kader van de nat. richtlijnen met specifieke aanwijzingen per land

((A)) = er is zeer miniem malariarisico in sommige gebieden – nooit chemoprophylaxe nodig, antimugmaatregelen volstaan in geval van mogelijk risico.