

Nieuw vaccinatieschema voor rabiës

Het nieuwe WHO-vaccinatieschema wordt toegepast in België vanaf 1 mei 2018.

26-04-18



Dit is de omschrijving

Vanaf 1 mei 2018 werd in België het preventief vaccinatieschema aangepast van drie visites over 28 dagen naar een vereenvoudigd schema van twee visites over zeven dagen. Deze aanpassing volgt op een nieuw gepubliceerde WHO-richtlijn voor rabiës (april 2018).

Het rabiësvaccin zal toegediend worden op dag 0 en dag 7 en kan via twee technieken toegepast worden:

- Ofwel als een dubbele intradermale dosis (2 x 0,1 ml) op twee verschillende injectieplaatsen (bv. in de anterior-zijde van beide voorarmen).
- Ofwel als 1 dosis (1 ml) intramusculair in de deltoideus-spier.

Preventieve vaccinatie is aangewezen voor de volgende personen:

- Personen die lang verblijven in een risicogebied of in afgelegen gebieden waar geen medische hulp op korte termijn beschikbaar is.
- Personen die veel reizen naar endemische gebieden.
- Reizigers die een langdurige fietstocht ondernemen of joggers in endemische gebieden.
- Kinderen die met hun ouders gaan wonen in endemische gebieden.
- Personen die een verhoogd risico lopen door hun beroep of activiteiten zoals bijvoorbeeld dierenartsen, boswachters, studenten diergeneeskunde, of vrijwilligers die vleermuizen beschermen.
- Militairen die op missie vertrekken naar endemische gebieden.
- Laboranten of experts die om beroepsredenen met het virus in aanraking komen (bv. laboratoriumactiviteiten).

U kan voor uw rabiësvaccinatie terecht in alle gelekoortsvaccinatiecentra en, indien beschikbaar in een erkende apotheek, ook bij de huisarts.

[Kaart rabiëverspreiding](#)